095253/5000/DE

Traumeel® S Gel

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.
Wenden Sie dieses Arzneimittel immer genau wie in dieser Packungsbeilage beschrieben bzw. genau nach Anweisung Ihres Arztes oder Apothekers an.
- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.
- Wenn Sie sich nicht besser oder gar schlechter fühlen, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Traumeel S Gel und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Traumeel S Gel beachten?
3. Wie ist Traumeel S Gel anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Traumeel S Gel aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Traumeel S Gel und wofür wird es angewendet?

Homöopathisches Arzneimittel

Registriertes homöopathisches Arzneimittel, daher ohne Angabe einer therapeutischen Indikation.
Bei während der Anwendung des Arzneimittels fortdauernden Krankheitssymptomen ist medizinischer Rat einzuholen.

2. Was sollten Sie vor der Anwendung von Traumeel S Gel beachten?

Traumeel S Gel darf nicht angewendet werden, wenn Sie allergisch sind gegen:
- einen der Wirkstoffe oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels
- Arnica montana (Arnika), Calendula officinalis (Ringelblume), Matricaria recutita (Echte Kamille), Echinacea, Echinacea purpurea (Sonnenhut), Achillea millefolium (Gemeine Schafgarbe), Bellis perennis (Gänseblümchen) oder andere Korbblütler

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen
Die Anwendung darf nur auf intakter Haut erfolgen. Der Kontakt des Gels mit Augen und Schleimhäuten muss vermieden werden.

Anwendung von Traumeel S Gel zusammen mit anderen Arzneimitteln
Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden, kürzlich andere Arzneimittel angewendet haben oder beabsichtigen andere Arzneimittel anzuwenden.

Die Wirkung eines homöopathischen Arzneimittels kann durch allgemein schädigende Faktoren in der Lebensweise und durch Reiz- und Genussmittel ungünstig beeinflusst werden.

Schwangerschaft und Stillzeit
Wenn Sie schwanger sind oder stillen, oder wenn Sie vermuten, schwanger zu sein oder beabsichtigen, schwanger zu werden, fragen Sie vor der Anwendung dieses Arzneimittels Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Traumeel S Gel sollte von Stillenden nicht im Bereich der Brust angewendet werden.

Traumeel S Gel enthält Alkohol
Dieses Arzneimittel enthält 2 g Alkohol (Ethanol) in 10 g Gel (20 % m/m).
Bei geschädigter Haut kann dies ein brennendes Gefühl hervorrufen.

3. Wie ist Traumeel S Gel anzuwenden?

Zur Anwendung auf der Haut.
Zur Dosierung befragen Sie Ihren Arzt.

Das Arzneimittel kann auch bei Säuglingen, Kleinkindern und Schulkindern angewendet werden.

Öffnen Sie den Tubenverschluss mit Hilfe des Dorns im Schraubverschluss.

Traumeel S Gel ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt. Eine großflächige Anwendung von Traumeel S Gel ist zu vermeiden.

Massieren Sie das Gel vorsichtig ein.
Das Gel kann mit leichten Stützverbänden angewendet werden. Bei der Anwendung als Verband nur luftdurchlässige Materialien (z.B. Baumwolle) verwenden. Bei Neugeborenen sollte kein Verband verwendet werden.

Der Kontakt mit Augen und Schleimhäuten soll vermieden werden. Die Anwendung darf nur auf intakter Haut erfolgen.

Wie alle Arzneimittel sollten auch homöopathische Arzneimittel ohne ärztlichen Rat nicht über längere Zeit angewendet werden.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Nebenwirkungen können mit folgender Häufigkeit auftreten:
Nebenwirkungen, die in klinischen Studien bekannt geworden sind:
Gelegentlich, kann bis zu 1 von 100 Behandelten betreffen
- Juckreiz
- trockene Haut

Weitere mögliche Nebenwirkungen:
Nicht bekannt: Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar
- vorübergehende Hautreaktionen, wie Hautausschlag

Bei auftretenden Nebenwirkungen ist das Arzneimittel abzusetzen und ein Arzt aufzusuchen.

Bei der Anwendung eines homöopathischen Arzneimittels können sich die vorhandenen Beschwerden vorübergehend verschlimmern (Erstverschlimmerung). In diesem Fall sollten Sie das Arzneimittel absetzen und Ihren Arzt befragen.

Meldung von Nebenwirkungen
Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind.
Sie können Nebenwirkungen auch direkt dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Abt. Pharmakovigilanz, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 3, D-53175 Bonn, Website: www.bfarm.de anzeigen. Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Traumeel S Gel aufzubewahren?

Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.

Die Tube dicht verschlossen halten.

Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und dem Behältnis nach Verwendbar bis: angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.

Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerbedingungen erforderlich.

Nach Anbruch 12 Monate haltbar.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Traumeel S Gel enthält
- Die Wirkstoffe pro 10,0 g Gel sind:
  Arnica montana Dil. D3 0,150 g
  Calendula officinalis Ø 0,045 g
  Hamamelis virginiana Ø 0,045 g
  Echinacea Ø 0,015 g
  Echinacea purpurea Ø 0,015 g
  Matricaria recutita Ø 0,015 g
  Symphytum officinale Dil. D4 0,010 g
  Bellis perennis Ø 0,010 g
  Hypericum perforatum Dil. D6 0,009 g
  Achillea millefolium Ø 0,009 g
  Aconitum napellus Dil. D1 0,005 g
  Atropa bella-donna Dil. D1 0,005 g
  Mercurius solubilis Hahnemanni Dil. D6 0,004 g
  Hepar sulfuris Dil. D6 0,0025 g
- Die sonstigen Bestandteile sind:
  Gereinigtes Wasser
  Ethanol 94% (m/m)
  Carbomer 980 NF
  Natriumhydroxid-Lösung 18 % (m/m)

Wie Traumeel S Gel aussieht und Inhalt der Packung
Traumeel S Gel ist ein bräunlich-gelb-grünliches Gel in Metalltuben aus beschichtetem Aluminium mit einem Schraubverschluss aus Kunststoff.

Packungsgrößen: 50 g Gel, 100 g Gel

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4, 76532 Baden-Baden
Telefon: 07221 501-00, E-Mail: info@heel.de

Weitere Angaben
Apothekenpflichtig
Reg.-Nr.: 7020960.00.00

Diese Packungsbeilage wurde zuletzt überarbeitet im Februar 2026.

-Heel